

8. Tentatives de suicide

F. Gurtner

Les tentatives de suicide ont été recensées par le système de déclaration Sentinella de juin 1986 à mai 1988. Le but de cette étude était plutôt d'examiner les possibilités préventives au cabinet médical en décrivant la relation médecin-patient avant l'événement. L'analyse détaillée de cette étude se fait dans le cadre d'une thèse qui est en cours. Un rapport complet sera publié durant l'année 1989.

8.1. Méthode


Les données suivantes ont été recueillies: en plus de l'âge et du sexe, détails sur le patient (métier, situation sociale, motifs du point de vue du médecin), moyen utilisé, traitement après l'événement ainsi que données détaillées sur la relation entre le médecin déclarant et le patient dans la période précédant l'événement. Les données ont été recueillies sur un questionnaire séparé envoyé au médecin deux semaines après la déclaration.

8.2. Résultats

Les résultats sur les circonstances précises de l'événement et sur la relation médecin-patient ne sont pas encore disponibles. C'est pourquoi on ne présentera ici que peu d'éléments sur les caractéristiques du collectif étudié.

172 suicides et tentatives de suicide ont été déclarés par les 161 médecins au cours de l'année de recensement 1987/88. Comme le but premier n'est pas de recenser l'incidence des tentatives de suicide, mais de décrire les circonstances de l'événement, les présentations suivantes s'en tiennent aux déclarations de tous les médecins (au contraire des autres chapitres).

Les déclarations se répartissent plus ou moins également au long de l'année et on n'a pas pu mettre en évidence une augmentation à un moment précis. La moyenne mensuelle pondérée montre une tendance à l'augmentation au début de l'été et de l'hiver (fig. 37).



8.3. Discussion

On trouvait déjà les différences caractéristiques entre les sexes au cours de l'année de recensement 1986/1987 (suicides réussis chez les hommes beaucoup plus fréquents; essentiellement tentatives de suicide chez les personnes plus jeunes, surtout chez les femmes). On attend d'autres résultats de l'analyse détaillée de la relation médecin-patient et qui ne sont pas encore rentrés. Les résultats de la première année d'étude (3) ainsi qu'un résumé des données de la 2ème année laissent présumer des résultats intéressants et utiles dans la pratique.

Sentinella 1987/88

Semaine: 1-2

Médecin (Code): 3-5

No 26300 6-10

1. Suspicion d'influenza

Année de naissance	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Sexe: M = 1, F = 2										
Consultation «uniquement» pour arrêt de travail										
Sinusite										
Otite moyenne										
Pneumonie										
Virologie										

5. Spécialiste/Hôpital

Année de naissance	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Sexe: M = 1, F = 2											
Hospitalisation											
Motif principal: diagnostique											
thérapeutique											
«psychologique»											
social											
Spécialité (selon code, voir au verso)											

6. Uretrite chez l'homme

Année de naissance	12	13	14	15	16	17	18	19
Chronique? (> 2 semaines)								
Dysurie?								
Si coloration Gram faite soi-même: mise en évidence de gonocoques = 1, pas de mise en évidence = 2								
Recherche de Chlamydia effectuée?								

2. Rougeole

12	13	14	15	16	17	18	19

3. Rubéole

12	13	14	15	16	17	18	19

4. Oreillons

12	13	14	15	16	17	18	19

7. Test VIH

Année de naissance	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Sexe: M = 1, F = 2														
Motif: risques (selon code, voir au verso)														
partenaire VIH positif														
partenaire à risques (selon code, voir au verso)														
symptômes														
angoisse														
Nombre de tests effectués antérieurement?														
Dont positifs?														
(préciser s.v.p. quand la première fois)														

9. Erythème chronique migrant

Année de naissance	12-14	15	16
Sexe: M = 1, F = 2			
Morsure de tique (anamnétique)			
si oui: quand? (jour, mois, année)	17-18		
ou? (NPA/Lieu)	19-22		
Manifestations cutanées seulement	23	24	25
Symptômes généraux	26	27	28
Arthralgies/arthritis	29	30	31
Symptômes neurologiques	32	33	34
Symptômes cardiaques			
Autres symptômes			
Traitement: tétracycline			
pénicilline			
érythromycine			
autres antibiotiques			
pas d'antibiotiques			
Sérologie			

8. Tentative de suicide

Année de naissance	12	13	14	15	16	17	18	19
Sexe: M = 1, F = 2								
Suites: traitement ambulatoire								
traitement en établissement								
décès								

Remarques: (résultats de laboratoire, p.ex. ECM; s.v.p. indiquer semaine, no de la formule, et év. no du patient)

Arzt- Patienten-Kontakte

Contacts médecin-patient

 Arzt:
Médecin:

 Woche:
Semaine:

 Sa
Sa 1

 So
Di 2

 Mo
Lu 3

 Di
Ma 4

 Mi
Me 5

 Do
Je 6

 Fr
Ve 7

	Initialen	Geschlecht		Jahrgang			Initialen	Geschlecht		Jahrgang	
	Initiales	Sexe		Année de naissance			Initiales	Sexe		Année de naissance	
		M/M	W/F					M/M	W/F		
		7	7	8-10	11			7	7	8-10	11
1.		1	2			21.		1	2		
2.		1	2			22.		1	2		
3.		1	2			23.		1	2		
4.		1	2			24.		1	2		
5.		1	2			25.		1	2		
6.		1	2			26.		1	2		
7.		1	2			27.		1	2		
8.		1	2			28.		1	2		
9.		1	2			29.		1	2		
10.		1	2			30.		1	2		
11.		1	2			31.		1	2		
12.		1	2			32.		1	2		
13.		1	2			33.		1	2		
14.		1	2			34.		1	2		
15.		1	2			35.		1	2		
16.		1	2			36.		1	2		
17.		1	2			37.		1	2		
18.		1	2			38.		1	2		
19.		1	2			39.		1	2		
20.		1	2			40.		1	2		