

Statistique Sentinella

Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 26. 8. 2005 et incidence par 1000 consultations (N/10³)

Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)


Semaine	31		32		33		34		Moyenne de 4 semaines	
Thème	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Suspicion de grippe	3	0.3	16	1.2	4	0.3	6	0.4	7.3	0.6
Crise d'asthme	12	1.4	10	0.7	13	1	8	0.6	10.8	0.9
Rougeole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéole	0	0	1	0.1	0	0	0	0	0.3	0
Oreillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	2	0.2	2	0.1	1	0.1	0	0	1.3	0.1
Otite moyenne	27	3.1	27	2	27	2	19	1.4	25	2.1
Pneumonie	6	0.7	12	0.9	16	1.2	8	0.6	10.5	0.8
Vaccination antigrippale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaccination antipneumococcique	1	0.1	2	0.1	3	0.2	5	0.4	2.8	0.2
Médecins déclarants	111		142		161		156		142.5	

Données provisoires

Déclarations Sentinella janvier 1994–décembre 2004

La coqueluche

Cas cliniques de coqueluche déclarés et recherche par PCR de *Bordetella pertussis* dans les frottis nasopharyngés. Janvier 1994–décembre 2004



Depuis l'épidémie de coqueluche enregistrée en 1994 et 1995 par le système Sentinella, le nombre

mensuel de cas déclarés pour 100 consultations n'a plus franchi les frontières de l'endémicité, évoluant

au contraire vers la baisse: pendant la période 1996-1999, la valeur moyenne de ce ratio était de

0.04 cas pour 100 consultations; en 2000-2004, 0.02 cas ont en moyenne été enregistrés (ratio ajusté pour le nombre de pédiatres, qui peut varier selon les années).

Pour l'année 2004, les enfants âgés de moins de 24 mois représentent 13.9% des cas cliniques déclarés, résultat comparable aux années précédentes. Cette proportion est de 68.9% pour les personnes de moins de 15 ans. On compte 56.7% de cas féminin parmi les cas âgés de moins de 15 ans et 63.9% parmi ceux de 20 ans et plus. Parmi les 151 cas cliniques déclarés, 3 enfants de 7 mois, 22 mois et 9 ans ont été hospitalisés.

Des analyses par PCR (*Polymérase Chain Reaction*) ont été effectuées en 2004 pour 131 des 151 cas déclarés (87%), parmi lesquelles 41 (27.2%) se sont révélées positives. Cette proportion était restée stable depuis 1996 (aux alentours de 20%), à la notable exception de l'année 2001 où le pourcentage de PCR positives était monté à 30%.

Selon une enquête menée en Suisse entre 1999 et 2003, la couverture vaccinale des enfants de 24 à 35 mois est estimée à 92.9% (au moins 3 doses) et 81.3% (au moins 4 doses). Le maintien d'une couverture vaccinale élevée demeure un élément essentiel de lutte contre la coqueluche, qui est une maladie pouvant causer dans de rares cas la mort parmi les jeunes enfants. De 1995 à 2001, trois décès causés par la coqueluche ont ainsi été rapportés en Suisse, survenus chez des enfants de 8, 9 et 11 semaines. Rappelons que l'OFSP recommande la vaccination de tous les enfants selon le plan de vaccination de routine (3 doses de DTPa, diphtérie, tétanos et coqueluche, pour la primo-vaccination, à l'âge de 2, 4 et 6 mois, suivies de 2 rappels de DTPa à l'âge de 15 à 24 mois et de 4 à 7 ans). ■

Office fédéral de la santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 031 323 87 06